


ONDA VERDE per l'appropriatezza Toscana?

I percorsi oncologici secondo gli indicatori EPICA





Letizia Bachini



Oncologia in Toscana: monitorare i percorsi e accogliere l'innovazione
Firenze, 15 Novembre 2019

Il progetto E.Pic.A.




La coorte E.Pic.A. 2017



Definizione di **caso incidente**: primo ricovero nell'anno solare (01/01-31/12) non preceduto da altri eventi (diagnosi / procedure chirurgiche) nei 3 anni precedenti.

La coorte incidente è individuata secondo i criteri ministeriali.

Colon – Retto: 1.770
(1.305 Colon – 465 Retto)
Mammella: 3.505



Il percorso colon-retto




Diagnostica strumentale (1, 2, 3, 4)



Chirurgia (5, 6, 7)





Oncologia (8)



ARS TOSCANA
agenzia regionale di sanità

Il percorso mammella




Diagnostica strumentale (1, 2, 3)



Chirurgia (4, 5)



Oncologia (6, 7)



ARS TOSCANA
agenzia regionale di sanità

KPis Colon-Retto

Diagnostica strumentale

KPI-1: % di pazienti che nei 60 giorni precedenti l'intervento chirurgico hanno eseguito almeno una tra le seguenti procedure di diagnostica strumentale: PET o scintigrafia ossea.

KPI-2: % di pazienti con carcinoma del retto che hanno eseguito nei 112 giorni precedenti l'intervento chirurgico almeno un esame diagnostico di RMN pelvica o ecografia transrettale o TAC.

KPI-3a: % di pazienti che hanno eseguito almeno una colonscopia nei 365 giorni successivi l'intervento chirurgico per tumore del colon.

KPI-3b: % di pazienti che hanno eseguito più di una colonscopia nei 365 giorni successivi l'intervento chirurgico per tumore del colon.

KPI-4a: % di pazienti che eseguono più di tre volte l'anno lo stesso marcatore tumorale (CEA o CA19.9), nell'anno successivo l'intervento chirurgico.

KPI-4b: % di pazienti che eseguono almeno una volta entrambi i marcatori tumorali (CEA e CA19.9), nei due anni successivi l'intervento chirurgico.

Chirurgia


KPI-5: % di pazienti con biopsia e tempo di intervento chirurgico di 60 o 90 giorni se candidati o meno a terapia neoadiuvante.

KPI-6: % di pazienti con durata della degenza oltre 15 giorni se DRG complicato oppure oltre 10 giorni se DRG non complicato.

KPI-7: % di pazienti con reintervento successivo all'intervento indice, all'interno della stessa SDO.

Onco

KPI-8: % di pazienti che iniziano la terapia adiuvante entro 56 giorni dal trattamento chirurgico.



KPis Mammella

Diagnostica strumentale

KPI-1: % di pazienti che nei 60 giorni precedenti l'intervento chirurgico hanno eseguito almeno uno tra i seguenti accertamenti: ECO epatica, TAC, risonanza, PET o scintigrafia ossea.

KPI-2: % di pazienti che nei 60 giorni successivi l'intervento chirurgico hanno eseguito almeno uno tra i seguenti accertamenti: ECO epatica, TAC, risonanza, PET o scintigrafia ossea.

KPI-3: % di pazienti che tra 60 e 365 giorni dopo l'intervento hanno eseguito uno tra i seguenti accertamenti: ECO epatica, TAC, risonanza, PET o scintigrafia ossea.

Chirurgia

KPI-4a: % di pazienti che ricevono entro 3 mesi un intervento di ricostruzione mammaria in intervento successivo a mastectomia.

KPI-4b: % di pazienti che ricevono entro 3 mesi un intervento di svuotamento ascellare in intervento successivo a mastectomia.


KPI-5: % di pazienti che ricevono un reintervento entro 120 giorni da intervento chirurgico conservativo.

Oncologia


KPI-6a: % di pazienti che iniziano la terapia adiuvante (chemioterapia) entro 60 giorni dal primo intervento.

KPI-6b: % di pazienti che iniziano la terapia adiuvante (ormonoterapia) entro 60 giorni dal primo intervento.

KPI-7: % di pazienti con resezione parziale che avviano il trattamento radioterapico entro 180 o 270 giorni dall'intervento chirurgico se candidati o meno a terapia adiuvante.




Il percorso colon-retto




 **soglia 100%**
KPI-2: 44,3%
preospedalizzazione

Il percorso mammella









42% risonanze
80,3% di risonanze
mammarie
KPI-1: 39 % vs 25,6%
(soglia <5%)


Soglia <5%
KPI-3: 16,5%
Possibile presenza di
pazienti di stadio avanzato



ARS TOSCANA
agenzia regionale di sanità

Riassumendo..

	Colon – Retto	Mammella
Diagnostica strumentale		
Chirurgia		
Oncologia		







Letizia Bachini (letizia.bachini@ars.toscana.it)